

# FICHE TECHNIQUE



**TRICO®** PEPINIÈRES

  
Solutions & Plants



## TRICO est LE RÉPULSIF CHEVREUIL professionnel

- > Produit **naturel**, utilisable en lutte biologique
- > Action **olfactive** et gustative
- > Efficacité **longue durée**
- > Action contre **abroutissement, frottis et écorçage**



Pour une protection efficace dès la plantation, et à moindre cout, **il peut être appliqué en pépinière.**

### Comment appliquer TRICO ?

La protection se fait **par simple pulvérisation de produit pur** sur les lignes de plants (ex. Douglas ci-contre) ou bien après arrachage (ex. Mélèzes en photo). Bien traiter la partie **apicale** du plant.



### Quand ?

Le traitement peut se faire **à tout moment**, sans toxicité pour les végétaux, mais de préférence juste avant le départ de la pépinière pour optimiser la durée de protection une fois les plants en forêt.

**Attention :** **laisser un temps de séchage** de la pulvérisation TRICO avant conditionnement pour une bonne fixation sur le plant.



Cette **durée de protection** est à minima de 4 mois pour les résineux.



Appliquer TRICO sur **végétal sec et par beau temps (> 10 ° C)** pour une meilleure accroche et efficacité dans le temps.



# FICHE TECHNIQUE

## TRICO® FORET



### TRICO est un RÉPULSIF CHEVREUIL professionnel

- > Produit **naturel**, utilisable en lutte biologique
- > Action **olfactive** et gustative
- > Efficacité **longue durée**
- > Action contre **abrouissement, frottis et écorçage**

### Comment appliquer TRICO en forêt :

#### Sur résineux

La protection se fait par **simple pulvérisation** de **produit pur**.  
Selon la taille du plant, il faut 4 à 8 ml / plant à protéger, soit 5 à 10 L / Ha pour une densité de 1 200 plants.

#### Quand ?

Le traitement peut se faire à **tout moment, sans toxicité** végétale

→ Automne / hiver, pour la protection des pousses terminales

→ Au printemps, pour la protection des nouvelles pousses

#### Durée d'efficacité sur conifères ?

Un minimum de **4 à 6 mois**, selon conditions météo.

#### Option particulière pour les résineux

Le plus économique est de se procurer des plants **déjà protégés en sortie de pépinière**, ce qui permet la mémorisation des cervidés dès la plantation.



*Plant traité au printemps  
et nouvelles pousses*



#### Sur feuillus

Le traitement est conseillé **juste après débournement**, pour une protection optimale au moment critique des attaques.

Diluer TRICO à 50% (1 litre de TRICO pour 1 litre d'eau)

Suite à dilution, **la persistance d'action est d'environ 2 mois**.

Comme la pousse feuillue est très dynamique, il est conseillé de refaire un passage au bout des 2 mois pour assurer une continuité de protection.



Appliquer TRICO sur **végétal sec et par beau temps (> 10 ° C)** pour une meilleure accroche et efficacité dans le temps.

